

Анализ:

Группа крови, резус-фактор

ВИЧ, сифилис, гепатит В, гепатит С

Клинический анализ крови, общий анализ мочи

Вагинальный мазок на флору

Анализ на антирезусные антитела (только при отрицательном резус-факторе)

УЗИ по беременности

Срок действия:

Бессрочно

60 дней

14 дней

7 дней

10 дней

Выполненное в клинике
REMEDİ

Подготовка к процедуре:

- **За 5 дней до процедуры:** необходимо отменить тромбоасс/кардиомагнил/аспирин, возобновить прием можно в день процедуры.
- **За сутки до процедуры:** нельзя вводить клексан/фраксипарин/фрагмин/другие низкомолекулярные гепарины. Возобновить введение можно через сутки после процедуры.
- Приходить на процедуру лучше после легкого завтрака.
- При отрицательном резус-факторе после процедуры необходимо ввести антирезусный иммуноглобулин. Его можно принести с собой (с соблюдением температурного режима) или приобрести в клинике (наличие лучше уточнить заранее).

После процедуры:

- в день процедуры запрещены авиаперелеты, занятия спортом, физические нагрузки. Поездки на поезде, автомобиле, общественном транспорте возможны;
- в течение 10 дней после процедуры лучше воздерживаться от половой жизни, занятий спортом, посещения бани и сауны;
- вечером можно снять пластырь (или раньше, если есть кожная реакция) и принять душ;
- при ощущении напряжения, потягивания, другом дискомфорте можно принять 2 таблетки но-шпы или поставить ректальную свечку с папаверином;

При возникновении жалоб необходимо обратиться за медицинской помощью.